



COMPLETE INSECT KILLER

For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules

This product contains Bayer's proprietary 2-way action formula. Bayer Advanced's 2-way action controls turf pests like ants, fleas, and ticks plus soil pests like grubs in one easy step. It not only kills existing pests quickly, but also keeps on protecting for up to 90 days. Keeping the yard, lawn, and around your home free of listed nuisance pests has never been easier.

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

KILLS	Ants, Fleas, Ticks, Grubs, Chinch Bugs, Mole Crickets, European crane fly larvae and other listed pests
COVERAGE	Covers up to 5,000 sq. ft.
WHERE TO USE	Lawn, Ground Covers, Flower Beds, Around Trees & Shrubs, and Around Homes
WHEN TO USE	General Surface Pests: Whenever insects are present White Grubs: May through July European crane fly larvae: Apply once, when adult insects are present in large numbers
HOW MUCH TO USE	See directions

For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG, (1-877-229-3724), or visit us on-line at www.BayerAdvanced.com

FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For best results, be sure to read and follow all label directions.

BEFORE YOU USE Read and follow these directions when using:

- Do not apply near fish pools, ponds, streams or lakes.
- Food interests such as lawnmowers and mowing cups should not be used for food purposes after use with this insecticide.
- Keep children and pets away from treated area until it has been watered and allowed to dry.
- Do not use in vegetable gardens.

HOW TO USE

HOME PERIMETER TREATMENT

PESTS
Ants, Centipedes, Cockroaches, Crickets, Digger Wasps, Earwigs, Millipedes, Pillbugs, Scorpions, Sowbugs, Spiders, Termites*

HOW MUCH TO APPLY
1/3 to 1/2 cup per 45 to 50 ft. (2 to 3 ft. band) 2 to 3 lbs. per 1000 sq. ft. Treats perimeter of driveway, 30 ft. by 60 ft. structures

HOW TO APPLY
Around the House To keep these pests away from your home, apply granules in a band 2 to 3 feet wide around and up to the structure.
For Ant Mounds or Wasp Burrows Sprinkle 1 to 2 tablespoons of granules over the ant mound or wasp burrow. Treat wasps at night, after they are back in their nest.

TO CONTROL PESTS IN AND AROUND THE LAWN

PESTS
Annual Bluegrass weevil (Hyperodes weevil), Ants, Armyworms, Billbugs, Black Turfgrass Acanthia, Chiggers, Chinch Bugs, Curlews, European crane fly larvae, Fleas, Ground Squirrels, Leafhoppers, Mealybugs, Mole Crickets, Mosquitoes, Sod Web worms (Jaw moth), Ticks (including deer ticks), White Grubs (including larvae of Adult Garden Bees, Black Turfgrass Acanthia, Chiggers, Japanese Beetle, May or June Beetle, and Oriental Beetle)

HOW MUCH TO APPLY
2 to 3 lbs. per 1000 sq. ft. Adjust your spreader to the proper setting. See the following table. This bag covers 5,000 sq. ft. which is the same as a band 5 feet wide and 1000 feet long.

HOW TO APPLY
Use rotary or drop type spreaders to apply granules evenly over the lawn, flower beds, ground covers, and around trees/shrubs. To be sure you cover lawn areas uniformly, first treat the border of the lawn then fill in the center. Make parallel passes, walking at a steady pace to ensure even distribution of the granules. Water thoroughly within a day after applying.
*For best control of white grubs, mole crickets, and European crane flies apply just before egg hatch. Contact your County Extension Agent for the ideal dates to apply in your area.

FOR BEST RESULTS

Water in thoroughly after applying. Do not mow until the granules are thoroughly watered in. To prevent pest damage, apply this product early when pests are still young and easier to kill. For control of European crane fly larvae apply 3 lbs per 1,000 sq. ft. Also, for improved and extended protection against all pests, apply at the high rate of 3 lbs per 1,000 sq. ft.

*This product will kill weevils and winged reproductive forms of termites that enter into the treed structures. Use of this type of product to kill termites should not be considered as substitute for soil treatment of subterranean termites done by a professional pest control operator.

IMPORTANT - Directions for Storage and Disposal

STORAGE CONDITIONS Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably in a locked storage cabinet.

DISPOSAL If Empty: Do not reuse this container. Place in trash or other for recycling if available. If Partly Full: Call your local solid waste agency or 1-877-229-3724 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin.
- Causes moderate eye irritation.
- Avoid contact with skin, eyes or clothing.
- Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.
- Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

FIRST AID

IN CASE OF ACCIDENTAL... IMMEDIATELY...

SWALLOWING Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF INHALED Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

CONTACT WITH EYES Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is toxic to fish. Do not apply directly to water. Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment wash water. Apply this product only as specified on this label.

NOTE: Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. Bayer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions. Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

¡LEER LA ETIQUETA PRIMERO!

DATOS RÁPIDOS

MATA	Hormigas, pulgas, garrapatas, gusanos, chinches del maíz, grillos cebolleros, larvas de la tipula europea y otras plagas de la lista
COBERTURA	Cubre hasta 5,000 pies cuadrados (464 m ²)
DÓNDE USAR	Césped, cubiertas vegetales, canchales, alrededor de árboles y arbustos y en los alrededores de las casas
CUÁNDO USAR	Plagas superficiales en general: siempre que se encuentren insectos Gusanos blancos: de mayo a julio Larvas de la tipula europea: aplicar una vez, cuando se encuentren insectos adultos en grandes cantidades
CUÁNTO USAR	Ver las indicaciones

Para hacer preguntas o comentarios, llame al número gratuito 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) o visítenos en www.BayerAdvanced.com

SOLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en esta etiqueta. Para obtener mejores resultados, asegúrese de leer y seguir todas las indicaciones de la etiqueta.

ANTES DE USAR Leer y seguir estas indicaciones al usarlo:

- No aplicar cerca de piscinas, estanques, lagos o arroyos.
- No deben usarse utensilios de cocina, como cucharas y bases medidoras, para preparar alimentos después de usarlos con el insecticida.
- No permitir a los niños y a las mascotas alejadas del área tratada hasta que esta se haya regado y secado.
- No usar este producto en huertos.

CÓMO USAR

TRATAMIENTO DEL PERÍMETRO DE SU CASA

PLAGAS
Hormigas, campalés, cucarachas, grillos, avispas escavadoras, garrapatas, miriápidos, roedores, escorpiones, lepidos, arañas, termite*

CUÁNTO APLICAR
De 1/3 a 1/2 taza por 45 a 50 pies (2 a 3 pies de ancho) 2 a 3 lbs. (0.9 a 1.4 kg) cada 1000 pies cuadrados (93 m²) Tasa de aplicación debe ser uniforme de 30 a 60 pies (9 a 18 m)

CÓMO APLICAR
Alrededor de la casa: para mantener a estas plagas alejadas de su casa, aplicar los granules en una franja de 2 a 3 pies (0.6 a 0.9 m) de ancho a lo largo de la estructura. CONSEJO: un esparcidor manual facilita la tarea.
Para los hormigueros: separar de 1 a 2 cucharadas de granules sobre el hormiguero o colapso. Tratar los hormigueros al anochecer, luego de que las avispas regresen a su nido.

PARA CONTROLAR PLAGAS EN EL CÉSPED O ALREDEDORES:

PLAGAS
Gorgojos del césped anual (adultos), termite, gusanos soldados, escarabajos picudos (adultos), escarabajo negro (adulto), avela, chinches del maíz, gusanos cortadores, larvas de la tipula europea, pulgas, saltamontes, saltamontes, cucaracha, garrapatas, chinches del maíz, grillos cebolleros, oruga de tierra (grillos de tierra), garrapatas (incluida la garrapata de ganado), y gusanos blancos (incluidas las larvas del escarabajo de jardín de 2 a 3 pies (0.6 a 0.9 m), 2 a 3 lbs. (0.9 a 1.4 kg) cada 1000 pies cuadrados (93 m²)

CUÁNTO APLICAR
2 a 3 lbs. (0.9 a 1.4 kg) cada 1000 pies cuadrados (93 m²). Regular el esparcidor según la graduación adecuada. Ver la tabla a continuación. Esta bolsa cubre 5,000 pies cuadrados (464 m²), que equivale a una franja de 5 pies de ancho por 1000 pies de largo (1.5 m de ancho por 305 m de largo).

CÓMO USAR
Usar esparcidores de tipo rotatorio para aplicar los granules en forma pareja sobre el césped, canchales, cubiertas vegetales y en los alrededores de árboles y arbustos. Para asegurar que cubra las áreas de césped de manera uniforme, tratar primero las bordes y luego al centro. Hacer pasadas paralelas, a paso lento constante, para asegurar la distribución pareja de los granules. Regar bien durante las 24 horas después de la aplicación.
CONSEJO: para controlar mejor los gusanos blancos, grillos cebolleros y tipulas de roya, aplicar justo antes de que se abran los huecos. Póngase en contacto con el Representante de Extensión de su Condado para conocer las fechas de aplicación ideales para su zona.

PLAGAS

CUÁNTO APLICAR
1/4 de taza por hormiguero

CÓMO APLICAR
Hormigueros de hormiga: esparcir en forma pareja sobre el hormiguero. Tratar los hormigueros a medida que aparecen.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Regar bien luego de la aplicación.
- No segar hasta haber regado bien el césped.
- Para evitar daños de las plagas, aplicar este producto temprano cuando las plagas todavía son jóvenes y fáciles de matar.
- Para controlar la larva de la tipula europea, aplicar 3 lbs. (1.4 kg) cada 1000 pies cuadrados (93 m²).
- Además, para lograr una protección mejorada y control de los otros tipos de plagas, aplicar a una concentración de 3 lbs. (1.4 kg) cada 1000 pies cuadrados (93 m²).

*Este producto mata los termites vivos y reduce el número de termites que regresan a los sitios tratados. El uso de este tipo de producto para matar termites no debe considerarse un reemplazo del tratamiento del suelo contra termites subterráneos hecho por un profesional en control de plagas.

Los niños y a las mascotas pueden reingresar al área tratada una vez que el producto se haya regado y secado.

IMPORTANTE - Indicaciones de almacenamiento y eliminación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Almacene en el contenedor original en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave.

ELIMINACIÓN Si está vacío: No volver a utilizar el contenedor. Colocar el contenedor vacío en la basura o entregarlo para reciclaje. Si está parcialmente lleno: Llamar a su agencia local de residuos sólidos o al 1-877-229-3724 para recibir indicaciones sobre la eliminación. Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Peligros para seres humanos y animales domésticos

- Es perjudicial si se ingiere, inhala o absorbe por la piel.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Lavarse profusamente las manos con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, masticar goma de mascar o usar tabaco.
- Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

PRIMEROS AUXILIOS + EN CASO ACCIDENTAL DE... INMEDIATAMENTE...

INGESTIÓN Usar inmediatamente un centro de control de envenenamiento o un médico para consultas sobre el tratamiento. Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar. No inducir al vómito a menos que lo indique el médico o un centro de control de envenenamiento. No administrar nada por boca a una persona que está inconsciente.

INHALACIÓN Trasladar a la persona a un lugar fresco. Si hay poco respiratorio, llamar a 911 o a una ambulancia, luego darle respiración artificial, preferentemente boca a boca si fue posible. Usar un centro de control de envenenamiento o un médico para mayores consultas sobre el tratamiento.

CONTACTO CON LA PIEL, LOS OJOS O LA ROPA Quitar la ropa contaminada. Colocar la piel afectada bajo agua corriente abundante que se mueva durante 15 a 20 minutos. Lavar a un centro de control de envenenamiento o a un médico para consultas sobre el tratamiento.

CONTACTO CON LOS OJOS Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Usar un centro de control de envenenamiento o un médico para consultas sobre el tratamiento.

PELIGROS AMBIENTALES

Este producto es tóxico para los peces. No aplicar en forma directa al agua. No contaminar el agua al limpiar el equipo o al eliminar el agua de lavado del equipo. Aplicar este producto solo como se especifica en esta etiqueta.

NOTA: Al usar el centro de control de envenenamiento, leer la etiqueta del producto a mano. Evitar de buscar ayuda en una sala de emergencias o un control de un médico, menos que se indique lo contrario por el personal médico. Para obtener información sobre el envenenamiento, llame al número gratuito 1-877-229-3724. Ingredientes activos: 15% Imidacloprid [CAS # 138261-41-3] and 0.05% Beta-Cyfluthrin [CAS # 68359-37-5]

SPREADER SETTINGS/GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR

Broadcast Spreaders/Modelo de esparcidores	2 lb. Rate Setting/Modo de ajuste de 2 lb. (0.9 kg)	3 lb. Rate Setting/Modo de ajuste de 3 lb. (1.4 kg)	Distance Between Passes/ft. (Distancia entre las pasadas) (pies)
EARTHWAY E-V-N-SPRED ROTARY	10	11	3.5
K-GRO ROTARY	2	2.5	6
REPUBLIC EZ ROTARY (#540)	2	2.5	6
SCOTT'S EASY GREEN	25	26	3
SCOTT'S EDGE GUARD	2.25	2.5	3.5
SCOTT'S SPEEDY GREEN 1000	2	2.5	4.5
SCOTT'S SPEEDY GREEN 2000, 3000	4	4.75	6
SEARS ROTARY	2	2.5	6
VIGORO ROTARY (#SB-4000R)	2	3	3.5
VIGORO ROTARY (#SB-4300RD)	1	2	3.5

Drop Spreaders/Modelo de esparcidores por gotas	2 lb. Rate Setting/Modo de ajuste de 2 lb. (0.9 kg)	3 lb. Rate Setting/Modo de ajuste de 3 lb. (1.4 kg)	Distance Between Passes/ft. (Distancia entre las pasadas) (pies)
K-GRO DROP	5	5.5	N/A
REPUBLIC EZ DROP (#530)	5	5.5	N/A
SCOTT'S ACCU GREEN 1000, 2000	4	4.75	N/A
SCOTT'S ACCU GREEN 3000	3.5	4.25	N/A
SEARS DROP	5	5.5	N/A
VIGORO DROP (#DS-4000V, DS4300VD)	1.5	2	N/A

*Settings are approximate. The condition of your spreader, the speed at which you walk and uneven terrain may affect the rate of application. Calibrate your spreader according to manufacturer's directions.
TIP: 1000 sq. ft. = 20 ft. x 50 ft.
Do not use a spreader that applies granules in narrow, concentrated or uneven bands. Be sure the spreader works properly and spreads granules evenly.
*Las graduaciones son aproximadas. El estado del esparcidor, la velocidad a la que se camina y la irregularidad del terreno pueden afectar la tasa de aplicación. Debe calibrarse al esparcidor de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
CONSEJO: 1000 pies cuadrados = 20 pies x 50 pies (6.1 m x 15.2 m)
No usar un esparcidor que aplique los granules en franjas demasiado angostas, concentradas o irregulares. Asegúrese de que el esparcidor funcione correctamente y espacice los granules en forma pareja.
Produced by: Bayer Advanced, A Division of Bayer CropScience LP
P.O. Box 12014, 21 M. Alexander Drive, Research Triangle Park, NC 27709
Registred by the Environmental Protection Agency (EPA) under FIFRA. Made in USA
EPA Reg. No. 7265-31
Est. No. Indicated by 2nd and 3rd d (bits of the batch number on this package. (41) = 9158-041 (42) = 9158-042 (77) = 07088-MD-001 (78) = 5085-GA-01 (88) = 8198-AL-01 (98) = 7265-AL-1
Troy, NY, Bayer Advanced (E) (O) (R) and (S) are trademarks of Bayer

